

SUWG'ARMALI JERLERDIN DUZLANIW HÁM OĖAN QARSÍ GÚRESIW ILAJLARÍ (QARAÓZEK RAYONÍ MISALÍNDA)

DOI: <https://doi.org/10.66073/ReFocus-Conf/QAXAI/1037>

Kenesbaev Baxram Baxtiyarovich, Maqsetbayev Kamal, Arifetdinov Ilxam, Matmuratov
Quandiq

Qaraqalpaqstan awıl xojalıǵı hám agrotexnologiyalar institutı

ANNOTATSIYA

Usı teziste Qaraózek rayonı sharayatında suwǵarmalı jerlerdin ekinshi márte duzlanıw procesleri, olardıń júzege keliw sebepleri hám topıraqtıń meliorativ halatın jaqsılaw jolları úyrenilgen. Izertlew dawamında rayondaǵı jer degradatsiyasın azaytıw boyınsha ámeliy usınıslar islep shıǵılǵan.

Gilt sózler: *Qaraózek, suwǵarmalı jerler, duzlanıw, degradatsiya, grunt suwları, kollektor-drenaj, melioraciya, Aral boyı.*

KIRISIW

Búgingi kúnde global ıqlım ózgerisleri hám antropogen faktorlardıń tásiiri nátiyjesinde jer resurslarınń degradatsiyaǵa ushırawı dúnya júzilik ekologiyalıq mashqalalardan birine aylandı. Birlesken Milletler Shólkeminiń maǵlıwmatlarına kóre, jer júzindegi suwǵarmalı jerlerdin sezilerli bólimi hár jılı duzlanıw procesi sebepli paydalanıwdan shıǵıp qalmaqta. Bul mashqala, ásirese, arid hám yarım arid zonalarında jaylasqan regionlar, sonday-aq Oraylıq Aziya, atap aytqanda Aral boyı regionı ushın júdá krizisli tásirge iye. Jerlerdin duzlanıwı tek ǵana awıl xojalıǵı ónimleriniń azayıwına emes, bálki regiondaǵı ekologiyalıq teńsalmalılıqtıń buzılıwına hám xalıqtıń turmıs dárejesiniń tómendewine alıp kelmekte.

Qaraqalpaqstan Respublikası óziniń geografiyalıq jaylasıwı hám tábiyy-ıqlım sharayatı menen jer degradatsiyası proceslerine júdá belsendi aymaq esaplanadı. Aral teńiziniń qurıwı nátiyjesinde júzege kelgen ekologiyalıq krizis topıraq qatlamınıń ximiyalıq quramın ózgeritip, duzlanıw proceslerin tezlestirdi. Bul kontekstte, Qaraózek rayonı jerleri de ózine tán gidrogeologiyalıq hám ekologiyalıq qásiyetleri menen ajralıp turadı. Rayon jerleriniń sapasın saqlap qalıw hám ónimdarlıqtı arttırıw ushın suwǵarmalı jerlerdin ekinshi márte duzlanıwına qarsı gúresiw strategiyaların islep shıǵıw búgingi kúnniń eń aktual wazıypası bolıp qalmaqtada.

Qaraózek rayonında awıl xojalıǵı tiykarınan suwǵarmalı diyqansılıqqa tiykarlangan. Biraq, aymaqtaǵı grunt suwlarınń jer júzine jaqın jaylasıwı, ıqlımınıń keskin kontinentallıǵı hám puwlanıw dárejesiniń joqarılıǵı topıraқтаǵı mineral duzlardıń joqarıǵa kóteriliwine hám akkumulyatsiyalanywına (jıynalıwına) sebep bolmaqta. Jerlerdin ekinshi márte duzlanıwı nátiyjesinde topıraqtıń biologiyalıq belsendiligi tómendep, awıl xojalıǵı eginleriniń (paxta, biyday, palız eginleri) kózlengen ónimin beriw qábileti pasaymaqta. Bul bolsa, óz gezeginde regionda azıq-awqat qawıpsızlıǵın támiyinlew hám agrosanawat tarawın rawajlandırıw jolındaǵı tiykarlı tosıqlıqlardan biri bolıp esaplanadı.

Suw resurslarınń jetispewshiligi hám suwdıń mineralızaciya dárejesiniń artıp barıwı Qaraózek rayonı diyqanları hám fermer xojalıqları ushın qosımsha qıynshılıqlardı tuwdırmaqta. Suwdı tejewshi texnologiyalardıń jeterli dárejede engizilmewi hám kollektor-drenaj tarmaqlarınıń eskiriwi mashqalalı jaǵdaydı jáne de quramalaştıradı. Sonlıqtan, usı ilimiy teziste Qaraózek rayonı sharayatındaǵı jerlerdin meliorativ halatın turaqlı jaqsılaw, duzlanıw proceslerin ilimiy tiykarda analiz qılıw hám olardıń aldın alıw boyınsha zamanagóy, innovacion usıllardı qollanıw máseleleri úyrenildi.

Bul izertlew jumısının áhmiyeti, regiondağı suwǵarmalı jerlerdiń degradatsiyasın toqtatıw arqalı ekologiyalıq turaqlılıqtı támiyinlew hám awıl xojalıǵı ekonomikasın jańa basqıshqa kóteriw ushın usınıslar tayarlawdan ibarat.

Qaraózek rayonı aymaǵı gidrologiyalıq hám geomorfologiyalıq dúzilisi boyınsha Ámiwdáryanıń tómengi aǵımı, yaǵnıy teńiz boyı turaqlı tegisliklerinde jaylasqan. Rayon jerleriniń basım bólimi allyuvial shógindi jınıslardan ibarat bolıp, olar joqarı dárejede minerallashqan grunt suwlarınń saqlanıwı ushın qolaylı ortalıq jaratadı. Izertlewler kórsetkenindey, rayondağı suwǵarmalı jerlerdiń meliorativ halatına eń úlken unamsız tásir kórsetiwshi faktor — bul grunt suwlarınń jer betine júdá jaqın (ortasha 1.2–2.2 metr) jaylasıwı bolıp esaplanadı.

Qaraózek rayonınıń keskin kontinentallıq iqlımı, yaǵnıy jaz aylarında hawa temperaturasınıń +40–45°C ge shekem kóteriliwi hám jawın-shashınıń júdá azlıǵı puwlanıw procesin tezlestiredi. Bunday sharayatta topıraqtıń kapillyar kanalları arqalı grunt suwları joqarıǵa kóteriledi. Suw puwlanıp ketkeni menen, onıń quramındaǵı xloridli hám sulfatlı duzlar topıraqtıń tayanış (aktiv) qatlamında jıynalıp qaladı. Bul proceske "kapillyar kóteriliw" dep ayıladı hám ol ekinshi márte duzlanıwdıń tiykarǵı mexanizmi esaplanadı. Rayon topıraqlarınıń ximiyalıq analizi kórsetkenindey, bul jerde kóbinese xlorid-sulfatlı hám sulfatlı duzlanıw túrleri ushırasadı, bul bolsa eginlerdiń tamır sistemasın záhárlewshi eń toksik ortalıq esaplanadı.

Jerlerdiń meliorativ jaǵdayın turaqlı uslap turıwda kollektor-drenaj sistemalarınıń iskerligi sheshiwshi áhmiyetke iye. Qaraózek rayonındaǵı kóplegen diyqan xojalıqlarında drenaj tarmaqlarınıń tıńp qalıwı yamasa jeterli dárejede tazalanbawı nátiyjesinde suwdıń aydaǵısh qábileti (ottok) tómendegen. Drenaj sisteması jaqsı islemegen aymaqlarda grunt suwları krizisli dárejege kóteriledi, bul bolsa hár qanday suwǵarıwdan keyin topıraқта duzlardıń jıynalıwın jánede turaqlılastıradı. Házirgi waqıtta rayondağı suwǵarmalı jerlerdiń shamalan 60-70% hár túrli dárejede (kúshsiz, orta hám kúshli) shorlangan jerler qatarına kiredi.

Jerlerdiń degradatsiyasına tek gána tábiy faktorlar emes, bálki suwdan paydalanıwdaǵı qátelikler de sebep bolmaqta. Kóp jaǵdaylarda "shor juwıw" (promivka) jumısları jerdiń duzlanıw kartasına muwapıq emes, bálki ulıwma norma menen ótkeriledi. Sonday-aq, eginlerdi suwǵarıwda dástúriy ayaq suwǵarıw usıllarınan paydalanıw grunt suwlarınń dárejesin keskin kóterip jibermekte. Rayon sharayatında suwdı tejewshi texnologiyalar, atap aytqanda lazerli tegizlew jumıslarınıń jeterli dárejede alıp barılmawı jerdiń ayırım bólimlerinde suwdıń jıynalıp qalıwına, ayırım bólimlerinde bolsa qurǵaq qalıp, duz bórttip shıǵıwına alıp kelmekte.

Solay etip, Qaraózek rayonı jerleriniń degradatsiyası — bul tábiy-iqlım faktorları hám meliorativ tarmaqlardıń texnikalıq jaǵdayı menen tikkeley baylanıslı bolǵan quramalı ekologiyalıq proces. Bul proceslerdi toqtatıw ushın tek gána gidrotexnikalıq ilajlar emes, bálki topıraq quramın jaqsılawǵa qaratılǵan agro-biologiyalıq usıllardı keńnen qollanıw mıtajligi bar.

Qaraózek rayonınıń suwǵarmalı jerlerinde alıp barılǵan analizler hám meliorativ jaǵdaydı úyreniw nátiyjeleri tómendegi anıq usınıslardı islep shıǵıwǵa tiykar boldı. Bul usınıslar rayondağı jer degradatsiyasın toqtatıw hám awıl xojalıǵı ónimdarlıǵın turaqlı támiyinlewge qaratılǵan.

Ilmiy-ámeliy usınıslar:

Kollektor-drenaj tarmaqların sistema boyınsha modernizaciyalaw: Rayondağı grunt suwları dárejesin krizisli dárejege (2.0–2.5 m) túsiriw ushın bar bolǵan ashıq drenaj tarmaqların turaqlı túrde lamiqa hám shókpelerden tazalap turıw kerek. Sonday-aq, jańa texnologiyalıq jabıq gorizontál drenaj sistemaların engiziw topıraqtıń ekinshi márte duzlanıwınıń aldın alıwda joqarı nátiyje beredi.

Shor juwıw jumısların sanlastırıw: Shor juwıw ilajların ótkerıwden aldın hár bir atızdıń duzlanıw kartasın (duzlanıw dárejesi hám túrin) islep shıǵıw talap etiledi. Shor juwıwda suw normaların topıraqtıń mexanikalıq quramına qaray belgilew hám bul processti drenaj sisteması jaqsı isleytuǵın jerlerde ótkerıw lazim.

Fitomeliyativ usıllardan keńnen paydalanıw: Topıraq quramındaǵı artıqsha duzlardı "sorıp alıwshı" hám grunt suwları dárejesin tómendetiwshı (biologiyalıq drenaj) ósimliklerdi egiw kerek. Ásirese, Qaraózek sharayatında jonıshqa (lyusernā) egiw — jerdiń strukturasın jaqsılap, azot penen bayıtıwı menen birge, ekinshi márte shorlanıwdı 25-30% ke shekem azaytıw imkaniyatın beredi.

Suw tejewshı texnologiyalardı engiziw: Lazerli tegizlew jumısların ámelge asırıw suwdıń atız boylap bir tekis tarqalına hám suw tejelisine alıp keledi. Bul óz gezeginde jerdiń ayırım bólimlerinde suw jıynalıp qalıp, battapaqlanıw yamasa shor bórttip shıǵıwınan aldın aladı.

Juwmaqlap aytqanda, Qaraózek rayonı sharayatında suwǵarmalı jerlerdiń degradatsiyası — bul júdá quramalı hám turaqlı itibardı talap etetuǵın process. Izertlewler kórsetkenindey, jerlerdiń duzlanıwı tek ǵana tábiy faktorlarǵa emes, bálki suwdan hám jerden paydalanıwdıǵı agrotekhnikalıq qáteliklerge de tikkeley baylanıslı.

Rayonnıń awıl xojalıǵı potencialın saqlap qalıw ushın gidromeliyativ (drenaj) hám agrotekhnikalıq (almısıp egiw, fitomeliyaciya) ilajlardı kompleks túrde alıp barıw shárt. Tek ǵana usı usıllar arqalı jerlerdiń melioryativ halatın turaqlı jaqsılawǵa, ekologiyalıq turaqlılıqtı támiyinlewge hám aqırǵı nátiyjede "Oziq-ovqat xavfsizligi va qishloq xo'jaligi barqarorligi"na erisiw múmkin. Bul baǵdardaǵı ilimiy izertlewler hám olardı ámeliyatqa engiziw rayonımız diyqanshılıǵı ushın strategiyalıq áhmiyetke iye.

Ádebiyatlar dizimi

1. Mirziyoyev Sh.M. "Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti 80 yilligiga bag'ishlangan nutqi" (Ekologiyalıq mashqalalar boyınsha).

2. S.Mamatov, "Toproqshunoslik va tuproq melioratsiyasi", Tashkent - 2020.

Qaraqalpaqstan Respublikası Awıl xojalıǵı ministrliginiń Qaraózek rayonı boyınsha statistikalıq maǵlıwmatları.