



УДК: 631., 635.61.

**ҚАРАҚАЛПАҚСТАН ЖАҒДАЙЫНДА ҚАҰЫННЫҢ
«АЛА ГУРБЕК» СОРТЫН ЖЕТИСТИРИҰ АГРОТЕХНИКАСЫ**

Джалимбетов Муса Аяпбергенович

СПЭ ва КИТИ, КРес ИТС директоры

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19244443>

Аннотация: Қовуннинг Ала гурбек нави ёз пишар навлардан бўлиб, уруғи униб чиққандан сўнг 94-105 кунда пишиб етилишади. Юқори ҳосилдор, гектаридан 300-315 центнер қовун ҳосили беради.

Калит сўзлар: Қовуннинг “Ала гурбек нави”, навнинг биологияси, етиштириш агротехникаси, экиш, суғориш, озиклантириш, касаллик ва зараркундаларга қарши кураш, ҳосилни йиғиш.

Аннотация: Дыня сорта «Ала Гурбек» один из летнеспелых сортов, созревающий через 94-105 дней после прорастания семян. Она отличается высокой урожайностью, давая 300-315 центнеров с гектара.

Ключевые слова: Сорт дыни «Ала Гурбек», биология сорта, агротехника выращивания, посев, полив, подкормка, борьба с болезнями и вредителями, сбор урожая.

Abstract: The Ala Gurbek melon variety is a summer-ripening cultivar, ripening 94-105 days after seed germination. It is characterized by high yields, yielding 300-315 centners per hectare. **Keywords:** Ala Gurbek melon variety, variety biology, cultivation techniques, sowing, irrigation, fertilizing, disease and pest control, harvesting.

Қаўынның «Ала гурбек» сорты биологиясы. Ала гурбек сорты қаўынның жаз писер ең жақсы сортларының бири есапланады. Қарақалпақстанның барлық районларына хәм Хорезм областына кеңнен таралған. Ала гурбектиң 16 дан аслам формасы бар.

Ала гурбек қаўын сорты қабығының сырты тегис, ирилиги орташа, узынлығы 24-26 см, салмағы 3-6 кг, формасы шар тәризли, торлары бир-бири менен тутасқан, улыўма сыртқы реңи гунгирт сары. Ети қалың (6-7 см), талшықлары нәзик, тығызлығы орташа, жүдә суўлы, қурамында қанд муғдары көп (14-16%). Толық пискенде ети жумсақ, жүдә мазалы болады. Пәллесиниң қалыңлығы орташа, тухымы ири, жиңишке сопақ, ақ реңде болады. Бир қаўыннан 332-34 грамм тухым шығады.

Ала гурбек сорты орта писер сорт болып, тухымы көгергеннен кейин 94-105 кунде писип жетилеседи. Жоқары зурәәтли, гектарынан 300-315 центнер өним береді. Хәр бир тубинде орта есап пенен 2-3 қаўын болады. Басқа жерлерге жиберий ушын шыдамлылығы орташа, 15-20 кунге шекем сақлаўға болады. Таза пискен туринде желинеді, кептирий ушын жарамлы, қаўыннан жоқары сапалы 7-8% қақ алыўға болады.

Агротехникасы. Қаўынның Ала гурбек сортын бурынғы салы, жуўери, мәкке атызларына, партаў хәм тың жерлерге егилген жағдайда жоқары зурәәт береді. Қаўынлар органикалык, ширинди затларға бай, самал қағып хәм кун нуры жақсы тусип туратугын жерлерде жүдә жақсы өседі. Сая тусетугын жерлерге егилген қаўынлардың мазасы болмайды, зурәәти аз болады.



“SHIMOLIY MINTAQALARDA QISHLOQ XOJALIGINI RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB MASALALARI VA ULARNING INNOVATSION ECHIMLARI” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiya



Қауынның Ала гурбек сорты жеңіл хәм орташа соға топырақлы жерлерге егилсе, жақсы зурәт береді. Қауын нәллери жақсы раўажланып, жақсы тамыр урғаннан кейін топырақтың азмаз ашшылығына шыдайды, дузлардың бир қанша жоқары муғдары алдағы уақытта қауын туйнеклерінде қанттың көбірек муғдарда топланыуына жәрдем береді. Топырақтың сурим қатламында дуз муғдары 0,2-0,3%, соннан хлор 0,01-0,04% болса, бундай жерлерде палыз егинлери нормал дәрежеде өсип раўажлана алады.

Жерлерди шайып суўғарыў ҳазирги уақытта егислик жерлердің шорланыўына қарсы гуресиў ең тийкарғы әмелий илажлардан есапланады. Егер жер аз дәрежеде шорланған болса, онда улыўма нормасы гектарына 1500-2000 кубометр суў бериледи, орташа шорланған жерлер (шудигарланған участкаларда) еки-уш рет шайып суўғарылып, гектарына 3000-5000 кубометр суў бериледи.

Жерлерди егиске таярлаў. Қауыннан жоқары зурәт алыу ушын жерди терең етип суриў керек. Қауынды гузде 40-45 см тереңликте сурилип шудигарланып қойылған, жақсы шайып суўғарылған участкаларға егийди усыныс етиледі. Бәхәрде жерди шайып суўғарғаннан кейін жер тапқа келиўден атызларда ызғарлықты сақлаў ушын еки тәрәплеме тырмаланады. Бул, топырақта ызғарлықтың сақланыўына, жердің бир кәлипте тапқа келиўине хәм жерди егис алды ислеў ўақтында сурим катламының жақсы майдаланыўына жәрдемлеседи. Буннан кейін терең чизеллениў менен бирге мала басылады хәм қауын егиледи. Қауын кеш (майдың ақырында) егилетугын болса, онда егис алдында жерди чизеллеў ямаса оны 28-30 см тереңликте аудармай суриў талап етиледі, усынан кейін атыз бетиниң топырағын тегислеў хәм топырақты тығызлаў мақсетинде мала басылады.

Егис. Қауын егиу ушын жарылатуғын қарықлардың арасы 2,0-2,5 м, тереңлиги 50-60 см ге шекем, қарықтың ени 80—90 см болады. Хәр бир шанақтың аралығы ерте писер сортлар ушын 70 см, ал орта писер хәм кеш писер сортлар ушын 1 метр болыўы керек.

Қауын егийде тек ири, толық, сау тухымлар ғана жоқары зурәт береді. Сонлықтан егийден алдын тухымлар салыстырма салмағына қарай сортланады (ирикленеди). Тухымлар дәслеп ас дузының 1-2% ли еритпесине салынады хәм суў менен тез шайылып алынады. Тухым хәр бир шанақа 5-6 данадан 4-5 см тереңликте егиледи. Нәллердің толық көгериуин тәмийинлеў ушын хәр бир шанақтың устине ширинди қый, қум ямаса ағаштың майда қырындысы 1 см қалыңлықта салынып шығылады.

Қауынның Ала гурбек сортын ерте муддетлерде егий керек: Қарақалпақстанның туслик районларда 10 апрельден 1-май аралығында, арқа районларда 20-апрельден 10-май аралығында егий усыныс етиледі. Ерте хәм орта писер қауын тухымларының егис нормасы 4-5 кг/га.

Қауын егислигин тарбиялау жумыслары. Қауынларды тарбиялаў жумыслары нәллерди бирлеўден, пәлеклерин (қолларын) өсий бағдарларына қарай дурыслап жиберийден, қосымша азықландырыўдан, кетпенлеўден, қарық жарыўдан, туплерин жумсартып домбықлаўдан, қатар араларын культивациялаўдан хәм суўғарыўдан ибарат.

Нәл бир кулақ, болған дәўиринде қауынның қарық аралары чизель-культиватор менен 15-20 см тереңликте биринши рет жумсартылып шығылады. Бунда қауынның егилиў схемасына қарай бир ямаса еки бағдарда жумсартылады. Шанақлардың топырағы қол менен жумсартылып, нәллердің туби жеңиллеў домбықланып шығылады.



“SHIMOLIY MINTAQALARDA QISHLOQ XOJALIGINI RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB MASALALARI VA ULARNING INNOVATSION ECHIMLARI” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiya



Қаўын нәллери көгерип шыққаннан кейин арадан 30-35 кун өткеннен соң, нәллер 3-4 кулақ бола баслаған ўақытта қарық, аралары еки бағдарда жумсартылады, нәллердин айнала дөгереклери терең етилип босатылады хәм домбықланады. Сол ўақытта нәллер биротала бирленеди хәм хәр бир шанақта бир туптен нәл қалдырылады. Қарық аралары отвалсыз плуг пенен 30-35 см тереңликте сурилип жумсартылады. Буннан кейин нәллердин дөгереклери қол менен жумсартылып шығылады хәм домбықланады. Усының менен қарық араларын жумсартыў жумыслары тийкарынан тамамланады.

Суўғарыу. Қаўында 3-4 ҳақыйқый кулақ (жапырақ) пайда болғанда (көгерип шыққаннан кейин 30-35 куннен соң) биринши вегетативлик суў бериледи. Қаўын қарықлары азмаз ағыс пенен 1-2 кун даўамында суўғарылады, яғный 2-3 кун даўамында 4-5 мәртебе қайталанады, қарықтың ортасына шекем ағызылады, бунда қарық аралары тереңирек ызғарланады, бирак қарықтың басына суў шығып кетиуине жол қоймау керек. Суўғарғаннан кейин 2-3 куннен соң қарық аралары екінши мәртебе терең етилип жумсартылады хәм домбықланады.

Азықландырыу. Илмий тәжирийбелердин мағлуматы бойынша, қауын топырақтан 117-163 кг азот, 42-60 кг фосфор алады. Қауын егилетуғын жерлерге гузде жергиликли хәм минерал төгинлер берилип, 30-35 см етип шудигарлап қойылады. Қаўынға бир жыллык норма есабынан гектарына минерал төгинлерден 90-120 кг азот хәм 90-120 кг фосфор, 50 кг калий бериледи. Фосфор хәм калий төгинлери гузги шудигарлаў, ал азот төгинлери жерди егистен алдын ислеў ўақтында бериледи.

Кеселлик хәм зыянкеслери. Қауында көп ушырайтуғын хәм көп зыян келтиретуғын кеселликлери: фузариоз солыў, ун-шудринг хәм басқалар. Зыянкеслеринен аққанат, қаўын шыбыны, палыз ширеси, өрмекшикене, кемирийўши кўккурт қаўынға кушли зыян келтиреди.

Қаўын кеселликлерине қарсы агротехник илажларды дурыс алып барыў арқалы гуресиледи, алмаслап егий, тухымларды препаратлар менен ислеў берий, қатар араларына сыпатлы ислеў берий, көллетип суғармаў х.т.б.

Қауынға көп зыян келтиретуғы қаўын шыбынына қарсы гурес өсимликтин гуллеў дәўиринде басланып, 3-4 мәрте химиялық препаратлар менен ислеў бериледи. Препаратлардан: Карбофос 50% к.э -2 кг/га, Фуфанон 57% к.э -1 кг/га, Пилигрим 24,7% к.э -0,2 кг/га, Нестор 20% -0,3 кг/га.

Аққанат зыянкеси муғдары көп болғанда: аппловуд, саффлауд 25% н.кук.-0,5 кг/га; (пирипроксифен) адмирал 10% эм.к.-0,5 л/га; (ацетамиприд) комилот, нестер, энтоспиан, моспиан 20% н.к.-0,3 кг/га препаратларын қолланыў усынылады.

Зүрәтти жыйнаў. Ала гурбек сорты ерте (10 апрел - 1 май) егилген жағдайда июл айы 3 ши хәм август айы 1 ши он кунлигинде писип жетилеседи. Пискен қауынлары мәўсимде 3-4 мәртебе, яғный сабағынан аңсат жулынатугын ўақытта жыйнап алынады. Қаўынлар ерте азан менен узип алынады, пәлеклеринен узип алынғанда қалдырылған муртларының узынлығы 2-3 см болыўы керек. Узип алынған қаўынлар атыздан қол менен көтерип ямаса усти жумсак зәмберге салып шығарылып, ишине алдын-ала сабан төселген көликлер менен алып кетиледи.