

TUT JIPEK QURTI TUQIMININ' BAXARGI RAWAJLANIWIN' UYRENIW

DOI: <https://doi.org/10.66073/ReFocus-Conf/QAXAI/1077>

G.E.Abdrimova

Qaraqalpaqstan awıl xojalıǵı hám agrotexnologiyalar institutı Jipekshilik kafedrası baslıǵı, dotsent

J.Dawletmuratova

Qaraqalpaqstan awıl xojalıǵı hám agrotexnologiyalar institutı Jipekshilik qanıgeligi magistri

ANNOTATSIYA

Bul maqalada tut jipek qurtı tuqımlarınin' baxargı inkubaciya dáwirindegi rawajlanıw ózgeshelikleri, hár qıylı temperatura hám ıǵallıq rejelerinin' embrionallıq rawajlanıwǵa tásiri úyrenilgen. Pilleshilik tarawında sapalı hám birkelki qurt ashılıwın táminlew maqsetinde grena jandıraw texnologiyaların jetilistiriw máseleleri tallanǵan. Sonday-aq, jipek qurtı tuqımlarınin' janıw pátı hám tut japıraqlarınin' jetiliw pátleri ortasındaǵı sáykeslikti optimallastırıw boyınsha usınıslar berilgen.

Gilt sózler: *Tut jipek qurtı, grena (tuqım), inkubaciya, temperatura, ıǵallıq, embrionallıq rawajlanıw, pilleshilik, janlandıraw texnologiyası.*

Temanın aktualıǵı: Búgingi kúnde respublikamız awıl xojalıǵınin' áhmiyetli tarmaqlarınin' biri bolǵan pilleshilikti jánede rawajlandıraw, jipek ónimlerinin' sapasın xalqara standartlar dárejesine jetkeriw hám eksport potencialın arttırıw baslı wazıypalardan biri esaplanadı. Jipek qurttan bálent hám turaqlı pille hásilin alıw dáslepki nábette sapalı tuqım tayarlaw hám onı baxargı rawajlanıw (inkubaciya) dáwirinde durıs parwazishlewge tikley baylanıslı.

Tut jipek qurtı tuqımınin' báhargı rawajlanıw procesi júdá názik hám juwapkerli basqısh bolıp tabıladı. Grenanın qısqı tınıshlıq (diapauza) dáwirinen shıǵıp, aktiv biologiyalıq rawajlanıwǵa ótiwi sırtqı ortalıq faktorlarına, ásiyese, optimal temperatura hám salıstırmalı ıǵallıqqa kóp tárepten gárizli. Inkubaciya dáwirindegi kishigirim kemshilikler de tuqımınin' birkelki ashılmawına, qurtlardın' hár qıylı jasta bolıp rawajlanıwına hám aqıbetinde pille zıyanlanıwına alıp keliwi múmkin.

Izertlew jumısınin' obyektı sıpatında jipek qurtınin' monovoltin parodası Tetragibrid-3 hám «Silver-silk» kárxanasınan keltirilgen (xorijiy Qıtay qurtı) jipek qurtı tuqımları hám Navoiy wálayatınan ákelingen qurt tuqımları paydalanıldı.

Tájriybe jumısları Xojeli rayonında jaylasqan Xojeli «Pille» A/J ne qaraslı kárxanada alıp barıldı. Inkubaciya xanalarında tuqımlardıń normada rawajlanıwı ushın zárur bolǵan gigrotermik rejim (temperatura hám hawa ıǵallıǵı) turaqlı qadaǵalanıp barıldı. Qurt tuqımları 21-aprel kúni inkubatoriyaǵa janlandırawǵa qoyıldı. 3-5 may aralıǵında janlanıp shıqqan qurtlar fermer xojalıqlarına tarqatıldı. Izertlew dawamında embrionnıń rawajlanıw basqıshları, hár bir basqıshnıń dawamlılıǵı hám sırtqı faktorlardın' tásiri baqlandı.

Izertlewdin' usılları. Awıl xojalıǵı óndirisi menen shug'illanatug'ın hár bir fermer hám diyxan xojalıǵı basshıları hám olarda isleytug'ın qanıgeler ózleri jumis alıp barıp atırg'an aymaqtın' iqlim hám topıraq shárayatlari haqqında jeterli túsiniklerge iye bolıwları kerek boladı. Qaraqalpaqstan Ózbekstan Respublikasınin' arqa-batisında tegislik aymaqta Ámwdaryanın' tómengi quyar bóliminde jaylasqan bolıp, onin' uliwma jer maydani 166,6 min' kvadrat kilometrdi (1.01.2001 jil) quraydı. Awıl xojalıǵı ushin jaramlı bolǵ'an jer maydanlari Ámiwdarya deltasında jaylasqan bolıp, olar iqlim sharayati boyınsha shólistan zonanin' arqa aymaqlarina kiredi. Qaraqalpaqstannin' iqlimi keskin kontinental hám hádden tisqari qurg'aqshilig'i menen xarakterlenedi. Jaz aylari og'ada issi, qisi suwıq bolıp keledi.

Awil xojaliq daqillarining` ósip-rawajlaniwinda issiliq rejimi sheshiwshi faktorlardan bolip esaplanadi. Aymaqta toplanatug`in issiliq qori awil xojalig`i daqillarining` kóplegen túrleri hám olardin` sortlarining` ónimlerinin` toliq pisip jetilisiwin támiynley aladi. Túslík rayonlarda hawa rayi basqa zonalarg`a qarag`anda jilliraq bolip keledi. Mag`liwmatlarga qarag`anda  $+10^{\circ}\text{C}$  temperaturadan joqari bolg`an ortasha jilliq issiliq qori: túslík zonada - 4396°C ; orayliq zonada - 4064°C ; arqa zonada - 3839°C boladi. Daqillardin` ósip rawajlaniwi (vegetatsiyasi) dáwirinde alatug`in nátiyjeli (effektiv) temperaturaning` summasi boyinsha joqaridag`i zonalar bir-birinen pariqliq qiladi.

Qaraqalpaqstanning` iqlim shárayatinin` jáne bir ózgesheligi basqa aymaqlarg`a salistirg`anda báhár máwsimi kesh baslanip, ol qisqa waqit ishinde ótedi. Báhárdin` dáslepki aylari salqin keledi.

Sonliqtan ashiiq maydanlarda daqillar kún qizg`annan son` aprel ayinin` ishinde egile baslaydi Misali: orayliq zona (Nókis qalasi) aymaqlarinda mart ayinda hawanin` ortasha temperaturasi $+4,1^{\circ}\text{C}$ boladi, aprelda bolsa ol $13,9^{\circ}\text{C}$ shekem kóteriledi. Hawanin` ortasha temperaturasi jaz aylari  $24-28^{\circ}\text{C}$ , al gúz máwsiminin` sentyabr ayinda $19,4^{\circ}\text{C}$ hám oktyabr ayinda $10,7^{\circ}\text{C}$ átirapinda boladi.

Izertlew nátiyjeleri. Tut jipek qurtinın tuqımında rawajlanıp atırǵan embrionǵa sırtqı ortalıq faktorları (hawa temperaturası, ıǵallıq, jaqtılıq hám taza hawa) tikley tásir kórsetedi. Jipek qurtı suwıq qanlı (poykilotermik) organizm bolǵanlıǵı sebepgili, denesiniń óz temperaturası bolmaydı hám sırtqı sharayattın sál ǵana ózgerisine de keskin tásirlenedi.

Inkubaciya dáwirinde xanadaǵı hawa ıǵallıǵınıń 75-80% bolıwı táminlendi. Izertlew nátiyjeleri kórsetkenindey, hawa namlıǵı normada bolǵanda embrion birkelki rawajlanadı hám tuqımın ashılıw pátı joqarı boladı. Eger ıǵallıq rejimleri buzılsa, tuqımlardıń janlanıwı tartipsiz bolıp, qurtlardıń keselliklerge shalıwshańlıǵı artıp ketedi.

Tájriybe dawamında hár qıyılı aymaqlardan keltirilgen tuqımlardıń baxargı janlanıw dinamikasında tómendegi parıqlar anıqlandı: Fergana wálayatınıń «Silver-silk» kárxanasınan keltirilgen xorijiy Qıtay qurtı tuqımları jergilikli iqlim sharayatına tez maslastı hám joqarı biologiyalıq aktivlik kórsetti. Bul tuqımlardıń janlanıwshańlıǵı **25 grammdı** quradı.

Navoiy wálayatınan ákelingen qurt tuqımları bolsa salıstırmalı tóménirek kórsetkish kórsetip, olardıń janlanıwshańlıǵı **19 grammdı** quradı.

Bul kórsetkish Qıtay seleksiyasına sáykes bolǵan «Silver-silk» tuqımlarında saqlaw hám qıslaw procesleriniń optimal gigrotermik rejimlerde (temperaturanıń áste-aqırın páseyttiriw rejimi) shólkemlestirilgenligi menen túsindiriledi. Sonday-aq, optimal mikroklimat sharayatı embrionallıq rawajlanıw basqıshların teńlestiriwge hám qurtlardıń qutıdan bir tegis, salamat shıǵıwına alıp keledi.

FAYDALANǴAN ÁDEBIYATLAR

1. AxmedovN, MurodovS. - «Ipakchilik asoslari» - T. «Oqituvchi» 1998. Darslik
2. Axmedov N., Murodov S -"Ipak qurti ekologiyasi va boqish agrotexnikasi". -T." " 2004.Oquv qollanma
3. Axmedov N. – «Ipak qurti urug'ini jonlantirish». –T. 1992. O'quv qo'llanma,
4. Mirzayeva Y.Y “Tutchilik”(Uslubiy qo'llanma). TashDAU “Tahririyat-nas'hriyot”. Toshkent 2022 y.
5. Abduraxmanov A.Rojdestvenskiy-“ Ipak qurti urug'chiligi va naslchiligi". T.:1991 .Darslik.
6. Abdrimova G, Mirzayeva Yo. Tut ipak qurti biologiyasi -T 2024
7. Mohammed Shamsuddin – Silkworm Physiology. A Concise Textbook.Daya Publishing House.Delhi - 110035, 2009. P 208